

تشنج

بعلالیت غیر طبیعی و زیاد در مغز اسآ.


آشنج در اطفال به ۴ گروه تقسیم می شود.

۱-هیچ علت یا بیماری زمینه ای برای آشنج وجود دارد.

۲- به دلیل یک بیماری زمینه ای مثل تومور مغزی یجاد می شود که با روشهای تشخیص شناسایی می شود.



۲- به دلیل بیماری زمینه ای در مغز رخ می دهد که با روشهای تشخیصی قابل شناسایی نیست.



۴- به دلیل حادثه فیزیولوژیک گذرا مثل تب در کودک رخ می دهد.



علت آشنج در اطفال چیست؟

۱- کمبود اکسیژن رسانی به مغز

۲- کاهش قند خون

۳- کاهش کلسیم خون

۴- عفونت ها

۵- اختلالات دستگاه عصبی

۶- اعتیاد مادر به مواد مخدر

شایعترین علت آشنج در نوزادان، نرسیدن اکسیژن به مغز آنهاست.

علائم آشنج در اطفال چیست؟

اختلال در سطح هوشیاری، حرکات غیر ارادی در اعضای بدن کودک، دست و پا زدن و روی زمین افتادن، چرخش سر و چشمها به یک طرف و خیره شدن، حرکات انقباضی از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد و معمولاً کمتر از ۱۰ دقیقه طول می کشد.



آشنج کودک



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

مجموعه بهداشت و درمان شهرستان مازندران

مدرسه امام جعفر صادق (ع)

تشنج در اطفال



قفل شدن دندان ها آسیب نبیند. برای این کار از انگشتان خون استفاده نکنید. اطراف کودک را خلوت کنید و لباس های تنگ و زیورآلات را از گردنش باز کنید تا راحت تر نفس بکشد و در زمان تشنج آب یا ماده خوراکی به او ندهید و سریعاً به بیمارستان منتقلش کنید.



شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	تشنج در اطفال
تهیه کننده	واحد ارتقا سلامت
تأییدکننده علمی	آقای دکتر بابا مرادی
سمت	مدیر گروه اطفال
تاریخ تهیه	۱۳۹۶
تاریخ بازنگری	۱۴۰۳
شماره تماس	۴۴۲۱۰۹۲۲ - داخلی ۱۷۰

حتی گاهی کودک ممکن است بدون توجه به طراف شروع به دویدن کند. اگر کودک بدون تب دچار تشنج شد به این نکات توجه فرمایید:

✓ کودک شما تا زمانی که دکتر دستور می دهد اید داروی ضد تشنج مصرف کند.

✓ هیچ گاه داروی کودک را خودسرانه قطع نکنید با مقدارش را کاهش ندهید.

✓ این کودکان باید بدون محدود کردن فعالیت های جسمی همواره مراقبت شوند و هنگام کاری حساس مثل استحمام و شنا حتماً از نزدیک مراقب کودکان باشید.



✓ در صورت بروز تشنج در کودک سریعاً او را به پهلو بخوابانید جسم سفتی (چوبی یا چرمی یا پارچه ی بین دندان های کودک بگذارید تا زبانش در اثر