



واکسن آنفولانزا:



همان واکسن سرماخوردگی می باشد که بدلیل ایمنی پایین بیماران همودیالیزی باید تزریق گردد. زمان تزریق آن اوایل پاییز می باشد که ایمنی آن تا شش ماه می باشد. بیماران همودیالیزی هر سال باید این واکسن را تزریق کنند.



تصویر باکتری استرپتوکوک پنومونیه عامل بیماری پنومونی یا سینه پهلودر اطفال با سن بیشتر از شش ماه می توان این واکسن را تزریق کرد.

دلیل ایمنی پایین، بیماران دیالیزی نیاز به تزریق واکسن در این بیماران بیشتر می باشد بنابراین تزریق یکسری واکسن ها در این بیماران الزامی می باشد.



این واکسن ها شامل:

• واکسن آنفولانزا

• واکسن پنوموکوک

• واکسن هپاتیت B

واکسیناسیون معمول مانند: واکسن سرخک - سرخچه - وریون - دیفتی - کزاز و سیاه سرفه سه گانه طبق برنامه واکسیناسیون کشوری انجام می شود.

کیداً توصیه می شود قبل از انجام هر نوبت واکسیناسیون با پزشک خود مشورت کنید.

همچنین هنگام مراجعه به مرکز واکسیناسیون، دیالیزی و دن خود را به مسئول مربوطه اطلاع دهید.



واکسن پنوموکوک:

واکسن پنوموکوک جهت پیشگیری از عفونت پنوموکوک (پنومونی یا عفونت ریه) تزریق می گردد در کودکان با سن بالاتر از دو سال تزریق می گردد در بیماران همودیالیزی هر سه تا پنج سال یکبار باید تکرار گردد. در موقع تزریق عوارض خفیفی مثل درد، قرمزی، خارش و سوزش در محل تزریق ممکن است داشته باشد.

واکسن هپاتیت B:

ایمن سازی علیه بیماری «هپاتیت ب» برای گروههای پرخطر	
نوبت	زمان تزریق
اول	در اولین مراجعه
دوم	یک ماه بعد از نوبت اول
سوم	شش ماه بعد از نوبت اول

بیماران همودیالیزی قبل از واکسیناسیون از نظر HBSAg و HBS Ab بررسی شوند. در صورت منفی بودن



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

مركز بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ

مركز سلامت امام خمينی (ع)

واکسیناسیون در بیماران دیالیزی

خود مراقبتی

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	واکسیناسیون در بیماران دیالیزی خود مراقبتی
تهیه کننده	واحد ارتقاء سلامت - نچمه ارمنده
تأیید کنندگان علمی	آقای دکتر دربان
سمت	مدیر گروه داخلی
تاریخ تهیه	۱۳۹۶
تاریخ بازنگری	۱۴۰۳
شماره تماس	۴۴۲۱۰۹۲۲ - داخلی ۱۷۰

HBSA ϵ در سه نوبت با دوز دو برابر واکسن دریافت کنند
: بعد از آخرین تزریق واکسن یک الی دو ماه بعد تیتراژ آنتی
ادی چک و در صورت پایین بودن تیتراژ آنتی بادی باید
: دوباره واکسن تزریق شود و در صورت بالا بودن تیتراژ آنتی
ادی که نشانه اثر گذاری واکسن می باشد سالیانه این تیتراژ
آنتی بادی چک می شود.

کلیه بیماران همودیالیزی باید کارت واکسیناسیون داشته
باشند و بیمارانی که احتیاج به تزریق واکسن هپاتیت بی
دارند باید دقت کامل به تاریخ های نوشته شده در کارت
خود را داشته باشند و در تاریخ های نوشته شده به مرکز
مربوطه که اکثراً در همان مرکزی که دیالیز می شوند مرکز
واکسیناسیون وجود دارد مراجعه و واکسن تزریق کنند.

بیماران همودیالیزی واکسن هپاتیت در چهار دوز ۶ و ۱
: ۰ ماه با دوز دو برابر تزریق می شود در همه مراکز دیالیز
تیتراژ آنتی بادی هپاتیت بی به طور سالیانه چک می شود و
در صورت پایین بودن تیتراژ پرسنل شما را جهت تزریق
بجدد واکسن راهنمایی می کنند.